



## Hemimycena gracilis cf

## Nadel-Scheinhelmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Quél.) Singer 1943

Aktueller Name gem. MycoDB: Hemimycena gracilis (Quél.) Singer, Annales Mycologici 41: 121 (1943) [MB453715]

Basionym: Omphalia gracilis Quél., Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 9: 662 (1881) [MB244159]

Obligate Synonyme:

Trogia gracilis (Quél.) Dörfelt, Veröffentlichungen Museen der Stadt Gera. Naturkunde 4: 108 (1976) [MB325063]

Omphalina gracilis (Quél.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 662 (1886) [MB470385]

Marasmiellus gracilis (Quél.) Singer, Lilloa 22: 299 (1951) [MB300098]

Mycena gracilis (Quél.) Kühner, Encyclopédie Mycologique 10: 650 (1938) [MB252420]

Delicatula gracilis (Quél.) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 119 (1953) [MB296514]

## Makroskopische Bestimmung

makroskopisch

## Hutmerkmale

Hütchen 4-8 mm.

## Lamellenmerkmale

Lamellen laufen am Stiel herab. im ersten Moment denkt man an Mycena, die Lamellen laufen jedoch herab und die länglichen Sporen sind eindeutig.

mikroskopisch


## Sporenmasse

4.10.2009. Hemimycena gracilis. Hudelmoos. Sporen sehr schmal. 7-9 x 2-2,5 um.

## Gattung/en:


Hemimycena

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1036.htm>



Flammer, T©

1327 12.12.2021



Sporen

Flammer, R©

13292 12.12.2021