



Hymenochaete rubiginosa

Rotbrauner Borstenscheibling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae

Legitimate (J.F. Gmel.) Lév. 1846

Aktueller Name gem. MycoDB: Hymenochaete rubiginosa (J.F. Gmel.) Lév., Ann. Sci. Nat., Bot. 5: 151 (1846) [MB215861]

Basionym: Thelephora rubiginosa J.F. Gmel., Systema Naturae Ed. 13 2 (2): 1441 (1792) [MB245935]

Obligate Synonyme:

Auricularia ferruginea Bull., Herbar de la France 8 (85-96): t. 378 (1788) [MB175187]

Thelephora ferruginea (Bull.) Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Saëllandiae Septentrionalis et Orientalis 2: 395 (1803) [MB473366]

Stereum rubiginosum (J.F. Gmel.) Fr., Observationes mycologicae 1: 155 (1815) [MB118513]

Hymenochaete ferruginea (Bull.) Masee, J. Linn. Soc., Bot. 27: 103 (1890) [MB197477]

Stereum ferrugineum (Bull.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 550 (1838) [MB187765]

Thelephora rubiginosa Pers., Mycologia Europaea 1: 120 (1822) [MB496598]

Stereum rubiginosum (J.F. Gmel.) Fr., Observationes mycologicae 1: 155 (1815) [MB192384]

Thaelaephora rubiginosa J.F. Gmel. (1792) [MB566136]

Taxonomische Synonyme: Helvella rubiginosa Dicks., Fasciculus plantarum cryptogamicarum Britanniae 1: 20 (1785) [MB439920]

Häufiger Eichenbesiedler, dünnfleischig, in grossen Kolonien. Er wächst oft auch an der Unterseite von bereits sehr vermoderten Eichenstämmen. Bei feuchtem Wetter ist er oft mit zahlreichenden opalisierenden Guttinationstropfen besetzt. In frischem Zustand ist die Zuwachszone schön rostbraun.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Resupinat, semipileat

Gattung/en:Hymenochaete <https://www.mycopedia.ch/pilze/7614.htm>Phanerochaete <https://www.mycopedia.ch/pilze/7565.htm>



Hymenochaete rubiginosa

Rotbrauner Borstenscheibling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae



Flammer, T©

11789 22.12.2020



Flammer, T©

11837 23.12.2020



Flammer, T©

9033 25.05.2019



Flammer, T©

10504 05.02.2020

Niklausen



Hymenochaete rubiginosa

Rotbrauner Borstenscheibling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae



Flammer, T©

7257 06.03.2018



Hymenochaete rubiginosa

Rotbrauner Borstenscheibling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae

Legitimate (J.F. Gmel.) Lév. 1846

Aktueller Name gem. MycoDB: Hymenochaete rubiginosa (J.F. Gmel.) Lév., Ann. Sci. Nat., Bot. 5: 151 (1846) [MB215861]

Basionym: Thelephora rubiginosa J.F. Gmel., Systema Naturae Ed. 13 2 (2): 1441 (1792) [MB245935]

Obligate Synonyme:

Auricularia ferruginea Bull., Herbar de la France 8 (85-96): t. 378 (1788) [MB175187]

Thelephora ferruginea (Bull.) Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Saëllandiae Septentrionalis et Orientalis 2: 395 (1803) [MB473366]

Stereum rubiginosum (J.F. Gmel.) Fr., Observationes mycologicæ 1: 155 (1815) [MB118513]

Hymenochaete ferruginea (Bull.) Masee, J. Linn. Soc., Bot. 27: 103 (1890) [MB197477]

Stereum ferrugineum (Bull.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 550 (1838) [MB187765]

Thelephora rubiginosa Pers., Mycologia Europaea 1: 120 (1822) [MB496598]

Stereum rubiginosum (J.F. Gmel.) Fr., Observationes mycologicæ 1: 155 (1815) [MB192384]

Thaelaephora rubiginosa J.F. Gmel. (1792) [MB566136]

Taxonomische Synonyme: Helvella rubiginosa Dicks., Fasciculus plantarum cryptogamicarum Britanniae 1: 20 (1785) [MB439920]

Gattung/en:

Hymenochaete

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7614.htm>



Hymenochaete rubiginosa


Rotbrauner Borstenscheibling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae



Flammer, T©

10498 05.02.2020



Flammer, T©

10499 05.02.2020


Setae

Seten aus dem Hymenium herauswachsend
Setae



Flammer, T©

10500 05.02.2020



Flammer, T©

10501 05.02.2020