



## Kneiffiella barba-jovis cf

## Bärtiger Zähnchenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Schizoporaceae

Legitimate (Bull.) P. Karst. 1889

Aktueller Name gem. MycoDB: Kneiffiella barba-jovis (Bull.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 48: 371 (1889) [MB431749]

Basionym: Hydnum barba-jovis Bull., Herbar de la France 10 (109-120): tab. 481, fig. 2 (1790) [MB176998]

Obligate Synonyme:

Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss., Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 104 (1958) [MB298788]

Grandinia barba-jovis (Bull.) Jülich, International Journal of Mycology and Lichenology 1 (1): 35 (1982) [MB109786]

Odontia barba-jovis (Bull.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 528 (1838) [MB227133]

Sistotrema barba-jovis (Bull.) Pers., Mycologia Europaea 2: 200 (1825) [MB440424]

Xylodon barba-jovis (Bull.) Chevall., Flore Générale des Environs de Paris 1: 273 (1826) [MB472090]

Hydnum barba-jovi Bull. (1790) [MB265751]

Kneiffiella barba-jovi (Bull.) P. Karst. (1889) [MB531437]

Hydnum barba-jovis Bull. (1791) [MB372989]

Taxonomische Synonyme:

Peniophora prominens H.S. Jacks. &amp; Dearden, Mycologia 43 (1): 57 (1951) [MB302453]

Tubulicrinis prominens (H.S. Jacks. &amp; Dearden) Donk, Fungus 26: 14 (1956) [MB307189]

Odontia lanceolata H. Furuk., Bulletin of the Government Forest Experimental Station Meguro 261: 31 (1974) [MB318903]

Kneiffia irpicoides P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 48: 368 (1889) [MB220342]

Hyphodontia irpicoides (P. Karst.) Burds. &amp; M.J. Larsen, Mycotaxon 17: 515 (1983) [MB108981]

Kneiffiella irpicoides (P. Karst.) Henn., Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten insbesondere den

Nutzpflanzen : I. Tl., 1. Abt.: Fungi (Eumycetes): 141 (1898) [MB560061]

Hydnum barba-jovis With., An arrangement of British plants 4: 337 (1796) [MB153161]

Die dreieckigen, etwas sackförmigen Sporen mit prominentem Apikulus fallen sofort auf. Allerdings sind die Sporen im Schnitt etwas grösser als angegeben.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Körnig, sehr kleine unscheinbare ockerfarbene Flecken, man muss die Lupe nehmen um es zu erkennen.,

mikroskopisch

**Sporenmasse**

5.0 - 6.0 x 3.8 - 4.7 µm - Q: 1.14 - 1.56 (Ø LxB: 5.4 x 4.2 µm ØQ:1.3 AzM: 12)

**Sporenform**

Dreieckig (tetrahedral)

Varia

**Bestimmt als**

Grandinia barba-jovis

**Gattung/en:**

Kneiffiella

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9084.htm>



**Kneiffiella barba-jovis cf**

**Bärtiger Zähnchenrindenpilz**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Schizoporaceae

