



Kuehneromyces mutabilis

Stockschwämmchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. 1946

Aktueller Name gem. MycoDB: Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm., Mycologia 38: 505 (1946) [MB287387]

Basionym: Agaricus mutabilis Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 6, t. 9 (1774) [MB158909]

Obligate Synonyme:

Pholiota mutabilis (Schaeff.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 83 (1871) [MB145044]

Galerina mutabilis (Schaeff.) P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 176 (1960) [MB283091]

Dryophila mutabilis (Schaeff.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 69 (1886) [MB455849]

Taxonomische Synonyme:

Pholiota decurrens Velen., Ceske Houby 3: 503 (1921) [MB262884]

Pholiota pseudomarginata Hruby, Hedwigia 70: 321 (1930) [MB275449]

Wie der Name schon sagt, ist diese Art sehr variabel. Sie wächst normalerweise in grossen dichtgedrängten Gruppen auf Holzstrünken. Galerina marginata wächst eher in kleinen Gruppen, aber das ist kein wirklich zuverlässiges Merkmal, da ich schon öfters die beiden Pilze auf demselben Strunk oder Baumstamm gleichzeitig gefunden habe.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Büschelig auf Totholz, Baumstümpfen oder Holzschnitzeln

Substrat

An morschen Holzstümpfen, am selben Standort findet man oft auch den Gifthäubling.

Hutmerkmale

Hygrophan

Stielmerkmale

Schuppig, punktiert, genattert

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Braun

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Pilzig, angenehm

botanisch / ökologisch

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Frühjahr bis Spätherbst

Sehr häufig, Frühjahr bis Spätherbst

mikroskopisch

Sporenlänge

4 x 7 µm

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt, ohne Plage, mit Keimporus

Cheilozystiden

Flaschenförmig

kulinarisch

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Verwechslungsgefahr mit dem giftigen Galerina marginata!

Gattung/en:

Kuehneromyces

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3785.htm>



Kuehneromyces mutabilis

Stockschwämmchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Siehe auch

Galerina marginata <https://www.mycopedia.ch/pilze/4099.htm>
Hypholoma capnoides <https://www.mycopedia.ch/pilze/4056.htm>

Verwandte Themen & weiterführende Links:

Plage <https://www.mycopedia.ch/pilze/990.htm>



Kuehneromyces mutabilis

Stockschwämmchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

links Kuehneromyces mutabilis
rechts Galerina marginata



Flammer, T©

14676 05.03.2023



Flammer, T©

5698 07.12.2014



Flammer, T©

4264 03.12.2018



Flammer, T©

15711 11.09.2023



Kuehneromyces mutabilis

Stockschwämmchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

8860 15.11.2019



Flammer, T©

702 28.09.2009

ganz jung mit noch vorhandenem Velum



Flammer, T©

703 28.09.2009



Flammer, T©


3623 21.04.2014




Kuehneromyces mutabilis

Stockschwämmchen


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T© 4253 21.04.2014



Flammer, T© 3617 21.04.2014



Flammer, T© 4256 21.04.2014