



Kuehneromyces mutabilis

Stockschwämmchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. 1946

Aktueller Name gem. MycoDB: Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm., Mycologia 38: 505 (1946) [MB287387]

Basionym: Agaricus mutabilis Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 6, t. 9 (1774) [MB158909]

Obligate Synonyme:

Pholiota mutabilis (Schaeff.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 83 (1871) [MB145044]

Galerina mutabilis (Schaeff.) P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 176 (1960) [MB283091]

Dryophila mutabilis (Schaeff.) Quéél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 69 (1886) [MB455849]

Taxonomische Synonyme:

Pholiota decurrens Velen., Ceske Houby 3: 503 (1921) [MB262884]

Pholiota pseudomarginata Hruby, Hedwigia 70: 321 (1930) [MB275449]

Ein Büschel mit Riesenexemplaren, das mich lange genarrt hat. Aber die Cheilozystiden und anderen Merkmale sind ganz eindeutig.

makroskopisch

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Weiss

Hutfarbe

Orange-ocker

Stielbasis / Basis

Fleisch braun

Stielmerkmale

Mit deutlicher Ringzone, darunter weisslich genattert

Lamellenfarbe

Blass-fleischfarben

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Würzig angenehm, pilzig-porlingsartig

botanisch / ökologisch

Standort

Picea-Stumpf

mikroskopisch

Sporenmasse

Dickwandig, mit deutlichem Keimporus

Cheilozystiden

Flaschenförmig mit gewellten langen Hälsen

Gattung/en:

Kuehneromyces

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3785.htm>



Kuehneromyces mutabilis

Stockschwämmchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

13083 25.10.2021



Flammer, T©

13084 25.10.2021