



Lasiosphaeria ovina

Eiförmiger Kohlenkugelpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Sordariomycetidae, Sordariales, Lasiosphaeriaceae, Lasiosphaeria

Legitimate (Pers.) Ces. & De Not. 1863

Aktueller Name gem. MycoDB: Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not., Commentario della Società Crittogamologica Italiana 1 (4): 229 (1863) [MB201441]

Basionym: Sphaeria ovina Pers., Synopsis methodica fungorum: 71 (1801) [MB233936]

Obligate Synonyme:

Lasiosordariella ovina (Pers.) Chenant., Bulletin de la Société Mycologique de France 35: 78 (1919) [MB232795]

Leptospora ovina (Pers.) Auersw., Fungi Rhenani Exsiccati Fasc. 8: no. 788 (1863) [MB187754]

Lasiella ovina (Pers.) Quéél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard sér. 2, 5: 516 (1875) [MB431769]

Taxonomische Synonyme:

Lasiosphaeria chrysentera Carroll & Munk, Mycologia 56: 83 (1964) [MB332978]

Lasiosphaeria ovina var. aureliana Fairm., Journal of Mycology 10 (5): 229 (1904) [MB166994]

Diese kleinen Kügelchen muss man mit der Lupe entdecken, sie gleichen winzigen Boviste.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Die Perithezien haben eine Grösse von 0,5 bis 1 mm.

Gattung/en:

Lasiosphaeria

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8146.htm>



Flammer, T©

14134 19.09.2022



Flammer, T©

14135 19.09.2022