



## Leccinum holopus

## Birkenröhrling, Moor-Birkenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae, Leccinum

Legitimate (Rostk.) Watling 1960

Aktueller Name gem. MycoDB: Leccinum holopus (Rostk.) Watling, Trans. Br. mycol. Soc.: 692 (1960) [MB333014]

Basionym: Boletus holopus Rostk., Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands 5-23/24: 131, t. 48 (1844) [MB232006]

Obligate Synonyme:

Krombholziella holopus (Rostk.) Šutara, Česká Mykologie 36 (2): 81 (1982) [MB109885]

Krombholzia holopus (Rostk.) Pilát, Klíč urcování nasich hub hřibovitých a bedlovitých: 65 (1951) [MB316091]

Trachypus holopus (Rostk.) Konrad & Maubl., Encyclopédie Mycologique 20: 116 (1952) [MB340189]

Trachypus scaber f. holopus (Rostk.) Romagn., Rev. Mycol. (Paris): 141 (1939) [MB254584]

Taxonomische Synonyme:

Leccinum nucatum Lannoy & Estadès, Documents Mycologiques 23 (89): 63 (1993) [MB361979]

Leccinum holopus var. nucatum (Lannoy & Estadès) Klofac, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 16: 257 (2007) [MB532005]

Krombholzia holopoda (Rostk.) Pilát (1951) [MB267121]

Dieser Raufussröhrling ist ein typischer Moorbewohner, der im moorigen Boden bei Birken gedeiht.

makroskopisch

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Bläut an den Schnittstellen

botanisch / ökologisch

**Mykorrhizapilz bei**

Betula

**Gattung/en:**

Leccinum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1045.htm>



Flammer, T©

3315 27.10.2012