



Lepiota cristata

Stinkschirmling

Lepiota cristata	Lepiota cristata	(Bolton) P. Kummer	1871
	Agaricus cristatus	Bolton	1788
	Agaricus colubrinus var. cristatus	(Bolton) Persoon	1801
	Lepiota colubrina var. cristata	(Bolton) Gray	1821
	Lepiota cristata	(Bolton) P. Kummer	1871
	Lepiotula cristata	(Bolton) E. Horak	1968
	Lepiota cristata var. felinoides	Bon	1981
	Lepiota cristata var. exannulata	Bon	1981
	Lepiota cristata var. pallidior	Bon	1981
	Lepiota felinoides	(Bon) P.D. Orton	1984
	Lepiota subfelinoides	Bon & P.D. Orton	1985

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Hutdurchmesser bis 10 cm bei entsprechender Witterung möglich

Hutmerkmale

Mit orangefarbenen, braunen bis dunklem Zentrum, Hut feinschuppig

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Stechender Geruch, penetrant, süsslich, unangenehm

botanisch / ökologisch

Standort

Auf nackter Erde, oft gesellig

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Sehr häufig

mikroskopisch

Sporenlänge

5 -7 µm

Sporenform

Projektilähnliche Sporen mit Sporn

Gattung/en:

Lepiota <https://www.mycopedia.ch/pilze/1048.htm>

Siehe auch

Lepiota cristata <https://www.mycopedia.ch/pilze/4348.htm>



Lepiota cristata

Stinkschirmling



Flammer, T©

6854 02.12.2017



Flammer, T©

1245 28.09.2009



Flammer, T©

525 28.09.2009



Flammer, T©

524 09.08.2012



Lepiota cristata

Stinkschirmling




Flammer, T©

3134 02.10.2012




Flammer, T©

6814 19.08.2017



Flammer, T©

2726 02.10.2012



Flammer, T©

6815 19.08.2017