



## Lepiota ignipes

## Orangebrauner Schirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate

Locq. ex Bon 1978

Aktueller Name gem. MycoDB: *Lepiota castanea* Quél., Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 9: 661 (1881) [MB229205]

Taxonomische Synonyme:

*Lepiota ignipes* Locq., Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 14: 59 (1945) [MB316504]

*Lepiota ignipes* Locq. ex Bon, Documents Mycologiques 8 (30): 70 (1978) [MB477258]

*Lepiota castanea* var. *castanea* (1881) [MB846199]

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Schwächliche kaum 2cm grosse Art, mit rotbraunem Hütchen

mikroskopisch

**Sporenmasse**

7.3 - 8.9 x 3.3 - 4.2 µm - Q: 2.04 - 2.58 (Ø LxB: 8.0 x 3.5 ØQ:2.3 AzM: 21)

**Sporenform**

Stumpf abgeflacht, mit seitlichem Sporn, sehr typische seitlich gespornte Lepiotasporen


**Gattung/en:**

Lepiota

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1048.htm>


Flammer, T©

16362 06.11.2023



Flammer, T©

16370 07.11.2023