



Lepista panaeola

Horngrauer Rötelritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Lepista

Legitimate (Fr.) P. Karst. 1879

Aktueller Name gem. MycoDB: Lepista panaeola (Fr.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 32: 481 (1879) [MB517167]

Basionym: Agaricus panaeolus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 49 (1838) [MB457354]

Obligate Synonyme:

Tricholoma panaeolum (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 82 (1872) [MB243507]

Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 32: 481 (1879) [MB355596]

Rhodopaxillus panaeolus (Fr.) Maire, Annales Mycologici 11 (4): 338 (1913) [MB432034]

Gyrophila panaeola (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 17 (1886) [MB492450]

Tricholoma panaeolus (Fr.) Quél. (1872) [MB542124]

Gyrophila panaeolus (Fr.) Quél. (1886) [MB542133]

Gyrophila panaeolus var. panaeolus (?) [MB542135]

Lepista panaeola var. panaeola (?) [MB540943]

Gyrophila panaeola var. panaeola (?) [MB536030]

Lepista panaeolus var. panaeolus (?) [MB417243]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus panaeolus var. calceolus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 49 (1838) [MB517819]

Tricholoma panaeolum subsp. calceolus (Fr.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 132 (1887) [MB139334]

Tricholoma panaeolum var. calceolus (Fr.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 132 (1887) [MB457350]

Tricholoma panaeolum var. calceolum (Fr.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 132 (1887) [MB566140]

Gyrophila panaeolus var. calceola (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 17 (1886) [MB542134]

Der stark mehlig schmeckende Pilz kann im jungen Stadium leicht mit Tricholoma verwechselt werden.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Relativ dickfleischig, in Gruppen, Hexenringe, Reihen wachsend

Hutmerkmale

Schmutzig-grau, wasserfleckig, hygrophan

Lamellenfarbe

Graue Lamellen

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Crème-rosa

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Mehlig, nicht unangenehm, nach Mehl

Geschmack

Stark nach Mehl

botanisch / ökologisch

Standort

Magerwiese

mikroskopisch

Sporenmasse

4.5 - 5.9 x 3.1 - 4 µm Q: 1.31 - 1.65 (Ø LxB: 5.3 x 3.6 µm)

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Warzig, grobwarzig-höckerig

Gattung/en:

Lepista

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1049.htm>



Lepista panaeola

Horngrauer Rötleritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Lepista

Siehe auch

- | | |
|------------------------|---|
| Lepista nuda | https://www.mycopedia.ch/pilze/4500.htm |
| Lepista sordida | https://www.mycopedia.ch/pilze/10034.htm |
| Tricholoma portentosum | https://www.mycopedia.ch/pilze/10280.htm |
| Tricholoma terreum | https://www.mycopedia.ch/pilze/4342.htm |



Lepista panaeola

Horngrauer Rötelritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Lepista



Flammer, T©

10164 23.10.2019



Flammer, T©

3385 23.10.2019



Flammer, T©

10260 29.10.2019



Flammer, T©

11173 17.10.2020



Lepista panaeola

Horngrauer Rötelritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Lepista

