



## Lophiostoma vagabundum cf

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Lophiostomataceae

Legitimate

Sacc. 1875

Aktueller Name gem. MycoDB: Lophiostoma vagabundum Sacc., Hedwigia 14 (5): 70 (1875) [MB316997]

Taxonomische Synonyme:

Lophiotrema vagabundum (Sacc.) Sacc., Michelia 1 (4): 338 (1878) [MB210555]

Lophiostoma origani var. vagabundum (Sacc.) anon. ined. (1875) [MB449955]

Lophiostoma vagabundum (Sacc.) Chesters & A.E. Bell: 22 (1970) [MB531558]

makroskopisch

**Substrat**

Laubholz

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Farblos, hyalin

mikroskopisch

**Sporenmasse**

23.0 - 27.7 x 5.1 - 7.7 µm - Q: 3.58 - 5.19 (Ø LxB: 26.1 x 6.0 ØQ:4.4 AzM: 10)

**Sporenmerkmale**

1fach septiert

chemisch

**Barals**

Negativ

Varia

**Bemerkungen / Hinweise / Abstract**

Durchschnittliche Sporengrösse ist über derjenigen in der Literatur von B. Wergen. Sie liegen zwischen Lophiostoma vagabundum und Lophiostoma corticola

**Bestimmt nach**

Handbook of Ascomycota Vol Ia und Vol Ib - Wergen, Björn - Funghiparadise Production

**Gattung/en:**

Lophiostoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8336.htm>



**Lophiostoma vagabundum cf**

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Lophiostomataceae




Flammer, T©

14841 07.04.2023



Flammer, T©

14812 03.04.2023



Flammer, T©

14813 03.04.2023



Flammer, T©

14814 03.04.2023