



## Lycoperdon marginatum

## Abblätternder Stäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate

Vittad. 1839

Aktueller Name gem. MycoDB: Lycoperdon marginatum Vittad., Florula Caprariae: 226 (1839) [MB220937]

Dieser Bovist hat kein Hals. Die Subgleba macht etwa 1/5 der Gleba aus. Geruch nicht unangenehm. Die Warzen lassen sich nicht gut abschälen, lässt man den Bovist jedoch liegen fallen diese bei Reife in Schollen ab. Ich vermute dass dieser Bovist manchmal übersehen wird, da er in frischem Zustand einfach an einen Bovist erinnert, der nicht so richtig zugeordnet werden kann.

makroskopisch

**Peridie**

Mit unterschiedlichen pyramidenförmigen Warzen, aus welchen Hyphenbüschel hervorspringen. Gemäss Literatur besitzen folgende Arten in etwa solche Warzen: Lycoperdon foetidum, Lycoperdon echinatum und Lycoperdon marginatum. Lycoperdon perlatum ist im Gegensatz von flaschenförmiger Struktur.

mikroskopisch

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Warzig

Varia

**Verweis**

Lycoperdon subcretaceum (montane Art) mit kleinen schwach warzigen Sporen

**Gattung/en:**


Lycoperdon <https://www.mycopedia.ch/pilze/3814.htm>



*Lycoperdon marginatum*

Ablätternder Stäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

9750 19.08.2019



Flammer, T©

9729 18.08.2019

Peridie



Flammer, T©

9732 18.08.2019



Flammer, T©

9731 18.08.2019



**Lycoperdon marginatum**

**Ablätternder Stäubling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

9730 18.08.2019