



## Lycoperdon molle

## Weicher Stäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate

Pers. 1800

Aktueller Name gem. MycoDB: Lycoperdon molle Pers., Observationes mycologicae 2: 70 (1800) [MB271483]

Taxonomische Synonyme:

Bovista cepiformis Wallr., Flora Cryptogamica Germaniae 2: 392 (1833) [MB206704]

Lycoperdon cepiforme (Wallr.) Bonord. (?) [MB219135]

Lycoperdon gemmatum var. molle (Pers.) De Toni (1888) [MB166018]

Lycoperdon gemmatum var. furfuraceum Fr., Systema Mycologicum 3: 38 (1829) [MB498452]

Bovista cepaeformis Wallr., Flora Cryptogamica Germaniae 2: 393 (1833) [MB514662]

Apioperdon pyriforme hat glatte Sporen.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Mit glatter Peridie, nur feinen abwischbaren Wärzchen, gesellig in Gruppen, auf Erdboden wachsend

botanisch / ökologisch

**Vorkommen / Häufigkeit / Saison**

Auf Erde, nicht auf Holz

mikroskopisch

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Warzig

**Gattung/en:**

Lycoperdon

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3814.htm>

**Siehe auch**

Apioperdon pyriforme

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4410.htm>



Flammer, T©

5923 24.10.2015