



Lycoperdon umbrinum

Bräunlicher Stäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate

Pers. 1794

Aktueller Name gem. MycoDB: Lycoperdon umbrinum Pers., Annalen der Botanik (Usteri) 11: 28 (1794) [MB232824]

Legitimate

Hornem. 1823

Aktueller Name gem. MycoDB: Lycoperdon umbrinum Hornem. (1823) [MB232407]

Unterm Mikroskop fallen die geschwänzten Sporen und die zahlreichen abgefallenen Sterigmen sofort auf.. Auch der braune bis schwarzbraune Fruchtkörper unterscheidet diesen Bovist von den anderen Bovistarten.

makroskopisch

Stielbasis / Basis

Kurzer "Stiel" faltig

mikroskopisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Warzig

Sporenmerkmale

Geschwänzt mit Sterigma

Gattung/en:

Lycoperdon

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3814.htm>



Lycoperdon umbrinum

Bräunlicher Stäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae


dunkle Form



Flammer, T©


9761 21.08.2019

mit Sterigmen
Sporen



Flammer, T©

9775 21.08.2019



Flammer, T©

9762 21.08.2019



Flammer, T©

9763 21.08.2019