



## Marasmius torquescens

## Ledergelber Schwindling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae

Legitimate

Quél. 1872

Aktueller Name gem. MycoDB: Marasmius torquescens Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 221 (1872) [MB162378]

Taxonomische Synonyme:

Collybia fagi Kalamees, Scripta Mycologica Tartu 13: 60 (1986) [MB133182]

Marasmius fagi (Kalamees) Kalamees, Opera Botanica 100: 139 (1989) [MB126163]

Chamaeceras torquescens (Quél.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 457 (1898) [MB524440]

Um Marasmius cohaerens und Marasmius torquescens sich zu unterscheiden macht man am besten ein Präparat der HDS. Die Spinulae in der HDS sind gegenüber den büstigen Zellen von Marasmius cohaerens sehr deutlich unterscheidbar.

Makroskopisch kann man die beiden aufgrund der Stieloberfläche unterscheiden:

Marasmius cohaerens: glatter Stiel

Marasmius torquescens: haarig-flaumiger Stiel (Lupe)

makroskopisch

**Stielfarbe / Rinde**

Unten schwarz, oben rotbraun

**Stielmerkmale**

Zäh

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Hyalin

mikroskopisch

**Sporenmasse**

7-11 x 4-5 µm

**Sporenform**

Elliptisch

**Hutdeckschicht**

Hutdeckschicht mit bräunlichen, dickwandigen Spinulae. Die nicht sehr zahlreichen Spinulae findet man im bräunlichen Zentrum im Hut.

**Gattung/en:**

Marasmius <https://www.mycopedia.ch/pilze/1056.htm>

**Siehe auch**

Marasmius cohaerens <https://www.mycopedia.ch/pilze/5803.htm>



*Marasmius torquescens*

Ledergelber Schwindling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae



Flammer, T©

2764 28.08.2019




Flammer, T©

1419 19.11.2009


Sporen

Sporen



Flammer, T©

5265 22.09.2014



Flammer, T©

5266 22.09.2014



Marasmius torquescens

Ledergelber Schwindling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae

