

**Mycena meliigena cf****Rötlicher Borkenhelmling, Rötlicher Rindenhelmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate (Berk. &amp; Cooke) Sacc. 1887

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena meliigena* (Berk. & Cooke) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 302 (1887) [MB237287]Basionym: *Agaricus meliigena* Berk. & Cooke, Grevillea 6 (40): 129 (1878) [MB463357]

Obligate Synonyme:

*Prunulus meliigena* (Berk. & Cooke) Murrill, North American Flora 9 (5): 324 (1916) [MB503486]*Mycena meliigena* f. *meliigena* (?) [MB418746]*Mycena meliigena* var. *meliigena* (1887) [MB846206]

---

 Dieser Helmling ist aufgrund seiner subglobosen Sporen und dem Vorkommen auf Rinde gut zu bestimmen
 

---

mikroskopisch

**Sporenform**

Subglobos

**Cheilozystiden**

Mit fingerförmigen Auswüchsen

**Gattung/en:**

Mycena

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>**Siehe auch**

Mycena pseudocorticola


<https://www.mycopedia.ch/pilze/10352.htm>



*Mycena meliigena* cf

Rötlicher Borkenhelmling, Rötlicher Rindenhelmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Flammer, T©


14596 24.10.2022



Sporen und Cheilocystiden  
Sporen

Flammer, T©

14597 13.05.2023



Sporen

Flammer, T©

14598 24.10.2022