

**Mycena vulgaris****Klebriger Nadel-Helmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate (Pers.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena vulgaris* (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 108 (1871) [MB243283]Basionym: *Agaricus vulgaris* Pers., Neues Magazin für die Botanik 1: 104 (1794) [MB176486]Obligates Synonym: *Prunulus vulgaris* (Pers.) Murrill, North American Flora 9 (5): 326 (1916) [MB503502]

makroskopisch

Hutmerkmale

Schmierig

Stielmerkmale

Schmierig, gelatinös

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Rötend / bräunend

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Ranzig, wie Gurkenschnitzling

mikroskopisch


Cheilozystiden

Stark divertikuliert "gestrüppartige"

Gattung/en:*Mycena* <https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>**Siehe auch***Mycena cinerella* <https://www.mycopedia.ch/pilze/12239.htm>

Flammer, T©

13259 07.12.2021

Cheilozystiden, HDS und Stielzystiden alle gleichförmig gestrüppartig
Zystiden

Flammer, T©

13260 07.12.2021