



Osteina obducta

Knochenporling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae

Legitimate (Berk.) Donk 1966

Aktueller Name gem. MycoDB: *Osteina obducta* (Berk.) Donk, Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 44: 86 (1966) [MB335451]Basionym: *Polyporus obductus* Berk., London Journal of Botany 4: 304 (1845) [MB208032]

Obligate Synonyme:

Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22 (2): 365 (1985) [MB105584]*Grifola obducta* (Berk.) Aoshima & H. Furuk., Trans. mycol. Soc. Japan: 91 (1963) [MB331521]*Tyromyces obductus* (Berk.) Murrill, North American Flora 9 (1): 32 (1907) [MB472018]

Taxonomische Synonyme:

Polyporus osseus Kalchbr., Fungi Europaei exsiccati, Klotzschii herbarii vivi mycologici continuatio. Editio nov. Series secunda. Cent. 8: no. 706 (1865) [MB209573]*Grifola ossea* (Kalchbr.) Pilát, Beih. Bot. Zentbl.: 58 (1934) [MB253737]*Polypilus osseus* (Kalchbr.) Parmasto, Tartu riik. ülik. Toim. 136, bot. Works: 124 (1963) [MB337473]*Scutigera osseus* (Kalchbr.) Step.-Kart., Aphylophorovie gribi Urala [The Aphylophorales of the Ural]: 212 (1967) [MB339002]*Leptoporus osseus* (Kalchbr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 177 (1886) [MB469766]*Leucoporus osseus* (Kalchbr.) Quél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 404 (1888) [MB469788]*Polyporus zelleri* Murrill, Western Polypores (5): 13 (1915) [MB172611]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Sehr hartfleischiger, hell ockerfarbener Porling,

botanisch / ökologisch

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Selten

Gattung/en:

Osteina

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7648.htm>

Flammer, T©

15688 04.09.2023