



## Peniophora quercina

## Eichen-Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Peniophoraceae

Legitimate

(Pers.) Cooke 1879

Aktueller Name gem. MycoDB: Peniophora quercina (Pers.) Cooke, Grevillea 8 (45): 20 (1879) [MB399382]

Basionym: Thelephora quercina Pers., Synopsis methodica fungorum: 573 (1801) [MB235569]

Obligate Synonyme:

Corticium quercinum (Pers.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 653 (1821) [MB355786]

Corticium acerinum var. quercinum (Pers.) Brinkmann, Westf. Pilze (1906) [MB180900]

Peniophora quercina (Pers.) Cooke (1879) [MB188096]

Taxonomische Synonyme:

Stereum tuberculosum Velen., Ceske Houby 4-5: 762 (1922) [MB473256]

Auricularia corticalis Bull., Herbar de la France 10: t. 436:1 (1790) [MB161939]

Peniophora corticalis (Bull.) Bres., Atti dell'Istituto Reale dell'Accademia di Rovereto di Scienze 3: 114 (1897) [MB440260]

Kneiffia corticalis (Bull.) Bres., Annales Mycologici 1 (2): 101 (1903) [MB440043]

Thelephora corticalis (Bull.) Lam. &amp; DC., Flore française 2: 106 (1805) [MB205007]

Thelephora carnea J.F. Gmel., Systema Naturae 2 (2): 1441 (1792) [MB193339]

Corticium corticale (Bull.) Qué., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 10 (1888) [MB439766]

Thelephora carnea Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 396 (1803) [MB496590]

Thelephora agglutinata Pers., Mycologia Europaea 1: 134 (1822) [MB169091]

Peniophora pezizoides Masee, Botanical Journal of the Linnean Society 25: 141 (1889) [MB179643]

Lichen carneus Willd., Florae Berolinensis Prodomus: 358 (1787) [MB393816]

Peniophora carnea (Willd.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 48: 422 (1889) [MB473649]

Xerocarpus carneus (Willd.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 37: 134 (1882) [MB472081]

Thelephora carnea (Willd.) Humb., Florae Fribergensis Specimen plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens: 106 (1793) [MB473717]

Thaelaephora carnea Schrad. ex J.F. Gmel., Systema Naturae 2 (2): 1441 (1792) [MB566129]

Das Substrat ist morsches Laubholz, am ehesten Esche, was auf *P. limitata* hinweist. Die Fruchtkörper haben noch keine Sporen gebildet.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Schwarz-violett, rundliche Flecken, am Rand ausgefranst und später zu grösseren Flächen zusammenwachsend.

mikroskopisch

**Sporenform**

Allantoid-zylindrisch

**Zystidenform**

Lamprozystiden dickwandig, stark inkrustiert

**Gattung/en:**

Peniophora

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3874.htm>



Peniophora quercina

Eichen-Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Peniophoraceae



Flammer, T©

11839 31.12.2020



Flammer, T©


11838 23.12.2020

Lamprozystiden



Flammer, T©

11894 31.12.2020



Flammer, T©

11841 23.12.2020



Peniophora quercina

Eichen-Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Peniophoraceae

