



## Pholiota elegans

## Blassblättriger Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate

Jacobsson 1991

Aktueller Name gem. MycoDB: Pholiota elegans Jacobsson, Windahlia 19: 72 (1991) [MB354937]

Dieser Schüppling weist einige Ähnlichkeiten mit dem Gummischüppling auf, besonders was die HH anbelangt, die ziemlich gut abziehbar ist. Die Zystiden sind jedoch spindelig und überhaupt nicht kopfig. Wenn ich die mikroskopischen Merkmale sämtlicher Schüpplinge in Ludwig Erhard vergleiche komme ich am ehestens auf Pholiota elegans. Den lederartigen Geruch kann ich gut wahrnehmen und hat mich zusätzlich auf diese Art gebracht.

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Huthaut gut abziehbar, schleimig

**Stielbasis / Basis**

Orange-braun

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Angenehm

Lederartig

mikroskopisch

**Sporenmasse**

5.5 - 7.4 x 3.3 - 3.7 µm - Q: 1.63 - 2.19 (Ø LxB: 6.3 x 3.5 µm ØQ:1.8 AzM: 24)

**Cheilozystiden**

Spindelig, schwach dickwandig

**Chrysozystiden**

Spindelig mit gelbem Inhalt, etwas dickwandig

Varia

**Bestimmt nach**

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

**Gattung/en:**

Pholiota

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1072.htm>

**Siehe auch**

Pholiota gummosa

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10818.htm>



Pholiota elegans

Blassblättriger Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

13005 20.10.2021



Flammer, T©

13010 20.10.2021



Flammer, T©

13006 20.10.2021



Flammer, T©

13009 20.10.2021

Cheilozystiden



**Pholiota elegans**

**Blassblättriger Schüppling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

