



Pholiotina arrhenii

Rotbräunlicher Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina

Legitimate

(Fr.) Singer 1973

Aktueller Name gem. MycoDB: Pholiotina arrhenii (Fr.) Singer, Beihefte zur Sydowia 7: 77 (1973) [MB320092]

Basionym: Agaricus arrhenii Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 161 (1838) [MB210076]

Obligate Synonyme:

Conocybe arrhenii (Fr.) Kits van Wav., Persoonia 6 (1): 147 (1970) [MB311661]

Pholiota arrhenii (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 248 (1872) [MB257394]

makroskopisch

Stielmerkmale

Mit feingeriefter, verschiebbarer Manschette

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Braun (hellbraun-rostbraun)?

mikroskopisch

Sporenmasse

7.4 - 8 x 4.2 - 4.9 µm Q: 1.63 - 1.84 (Ø LxB: 7.8 x 4.5 µm)

Sporenfarbe in Wasser (Mik)

Gelblich

Sporenmerkmale

Dickwandig mit feinem Keimporus

Cheilozystiden

Spindelig

Gattung/en:

Pholiotina <https://www.mycopedia.ch/pilze/6826.htm>

Siehe auch

Pholiotina velata <https://www.mycopedia.ch/pilze/8042.htm>



Pholiotina arrhenii

Rotbräunlicher Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina



Flammer, T©


11285 21.10.2020



Flammer, T©


11284 21.10.2020

HDS



Flammer, T©

11287 21.10.2020



Flammer, T©

11286 21.10.2020