



Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Porpoloma pes-caprae

Spitzhütiger Wiesenritterling

Dieser Ritterling, der vorwiegend in ungedüngten Wiesen wächst fällt durch seine spröde Konsistenz auf. Es ist kein häufiger Pilz, er wächst auf Alpweiden und in Magerwiesen, vorwiegend in Höhenlagen ab 800 bis 900 Metern. Möglich ist eine Verwechslung mit gewissen Tricholoma Arten.

makroskopisch

Hutfarbe

Grau-braun

Hutmerkmale

Radial faserig, rissig, spitzbuckelig

mikroskopisch

Sporenform

Apfelkernförmig

chemisch

Melzers-Reagenz

Jod Sporen positiv (amyloid)

Gattung/en:

Porpoloma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4125.htm>


Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

Siehe auch

Tricholoma scalpturatum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/6694.htm>



Porpoloma pes-caprae

Spitzhütiger Wiesenritterling



Waldvogel, F©

2834 06.09.2012



Flammer, T©

5621 24.11.2014

Sporen




Flammer, T©

5620 24.11.2014



Flammer, T©

3756 09.09.2013



Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Porpoloma pes-caprae

Spitzhütiger Wiesenritterling

