



Psathyrella cotonea

Pinsel-Mürbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Quél.) Konrad & Maubl. 1949

Aktueller Name gem. MycoDB: Psathyrella cotonea (Quél.) Konrad & Maubl., Encyclopédie Mycologique 14: 126 (1949) [MB304283]

Basionym: Stropharia cotonea Quél., Bulletin de la Société Botanique de France 23: 328, XLIV (1877) [MB455733]

Obligate Synonyme:

Drosophila cotonea (Quél.) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 370 (1953) [MB296981]

Hypholoma cotoneum (Quél.) Lange, Dansk botanisk Arkiv 4 (4): 41 (1923) [MB537953]

Taxonomische Synonyme: Hypholoma cotonea (Quél.) Lange (1923) [MB455732]

Fund aus Süditalien am Fusse einer Palme in einem Park. Sehr stattliche Art in der Gattung Psathyrella.

makroskopisch

Büschelig

Hutmerkmale

Mit Flocken oder Schüppchen

Stielfarbe / Rinde

Weiss

botanisch / ökologisch

Standort

Fund am Fuss einer Palme in Süditalien

mikroskopisch

Sporenmasse

7,5-8 x 5-5,5 µm

Cheilozystiden

Keulig-blasig-utriform

Varia

Bestimmt nach

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag
Pilze der Schweiz, Breitenbach J., Kränzlin F.

Gattung/en:

Pholiota

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1072.htm>



Psathyrella cotonea

Pinsel-Mürbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

3295 27.10.2012



Flammer, T©

3294 27.10.2012

Cheilozystiden und Basidien

Cheilozystiden



Flammer, T©

3302 27.10.2012



Flammer, T©

3303 27.10.2012



Psathyrella cotonea

Pinsel-Mürbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

