



Pseudoporpoloma pes-caprae

Spitzhütiger Wiesenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hygrophoraceae, Pseudoporpoloma

Legitimate (Fr.) Vizzini & Consiglio 2016

Aktueller Name gem. MycoDB: Pseudoporpoloma pes-caprae (Fr.) Vizzini & Consiglio, Phytotaxa 243 (3): 274 (2016) [MB815367]

Basionym: Agaricus pes-caprae Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 45 (1838) [MB241918]

Obligate Synonyme:

Tricholoma pes-caprae (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 340 (1873) [MB145999]

Porpoloma pes-caprae (Fr.) Singer, Sydowia 6 (1-4): 198 (1952) [MB304183]

Gyrophila pes-caprae (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 16 (1886) [MB507641]

Gyrophila aggregata f. pes-caprae (Fr.) Quél., Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 18 (2): 508 (1890) [MB507800]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus multiformis Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 9, t. 14 (1774) [MB150855]

Porpoloma pes-caprae var. multiforme (Schaeff.) Bon, Documents Mycologiques 20 (79): 61 (1990) [MB127241]

Agaricus pes-caprae var. multiforme (Schaeff.) Cooke, Handbook of British Fungi: 365 (1891) [MB476912]

Tricholoma pes-caprae var. multiforme (Schaeff.) Masee: 211 (1893) [MB457091]

Agaricus lividus Huds., Flora anglica: 615 (1778) [MB490270]

Dieser Ritterling, der vorwiegend in ungedüngten Wiesen wächst fällt durch seine spröde Konsistenz auf. Es ist kein häufiger Pilz, er wächst auf Alpweiden und in Magerwiesen, vorwiegend in Höhenlagen ab 800 bis 900 Metern. Möglich ist eine Verwechslung mit gewissen Tricholoma Arten.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Brüchig

Hutfarbe

Grau-braun

Hutmerkmale

Radial faserig, rissig, spitzbuckelig

Lamellenmerkmale

Ausgebuchtet mit Zahn angewachsen

botanisch / ökologisch

Standort

Alpine, besonnte Trocken- und Magerwiesen

mikroskopisch

Sporenform

Apfelkernförmig

chemisch

Melzers-Reagenz

Jod Sporen positiv (amyloid)

Gattung/en:

Pseudoporpoloma <https://www.mycopedia.ch/pilze/11698.htm>

Tricholoma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>

Siehe auch

Tricholoma scalpturatum <https://www.mycopedia.ch/pilze/6694.htm>



Pseudoporpoloma pes-caprae

Spitzhütiger Wiesenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hygrophoraceae, Pseudoporpoloma



Flammer, T©

14655 28.02.2023



Flammer, T©

2834 06.09.2012



Flammer, T©

5621 22.02.2023



Flammer, T©

5620 24.11.2014



Pseudoporpoloma pes-caprae

Spitzhütiger Wiesenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hygrophoraceae, Pseudoporpoloma

