



## Pycnoporus cinnabarinus

## Zinnoberrote Tramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae

Legitimate (Jacq.) P. Karst. 1881

Aktueller Name gem. MycoDB: Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst., Rev. Mycol. (Toulouse) 3 (9): 18 (1881) [MB120171]

Basionym: Boletus cinnabarinus Jacq., Flora Austriaca 4: 2, tab. 304 (1776) [MB210619]

Obligate Synonyme:

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 323 (1849) [MB204756]

Polyporus cinnabarinus (Jacq.) Fr., Systema Mycologicum 1: 371 (1821) [MB189933]

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Cooke, Grevillea 14 (71): 82 (1886) [MB165971]

Coriolus cinnabarinus (Jacq.) G. Cunn., Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research, Plant Diseases Division 75: 8 (1948) [MB285619]

Leptoporus cinnabarinus (Jacq.) Quéf., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 176 (1886) [MB469759]

Phellinus cinnabarinus (Jacq.) Quéf., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 395 (1888) [MB470448]

Hapalopilus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst., Finlands Basidsvampar (11): 133 (1899) [MB469391]

Fabisporus cinnabarinus (Jacq.) Zmitr., Mycena 1 (1): 93 (2001) [MB466381]

Trametes cinnabarinus (Jacq.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 323 (1849) [MB449546]

Taxonomische Synonyme: Polyporus cinnabarrinus (Jacq.) Fr., Systema Mycologicum 1: 371 (1821) [MB496307]

Dieser leuchten orange-rote Pilz kann eigentlich nur schwer übersehen und verwechselt werden.

Ein weiterer Porling mit intensiven orangen Farben ist Pycnoporus fulgens (Leuchtender Orangeporling), der jedoch Nadelholz bevorzugt. Die KOH Reaktion dort ist rot.

Pycnoporus cinnabarinus ist weicher und hat vergängliche FK, die FK von P. sanguineus wachsen konsolenförmig.

makroskopisch

**Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum**

Lebhaft zinnoberrot, orangerot

botanisch / ökologisch

**Standort**

Betula

chemisch

**Kalilaugenreaktion / KOH**

Schwarz

Varia

**Bemerkungen / Hinweise / Abstract**

Die FK sind oft unförmig und haben nicht nur auf der Unterseite Poren. Sie scheinen auch gerne von gefräßigen Insekten und Käfern befallen zu werden und sind deshalb ziemlich vergänglich.

**Gattung/en:**

Pycnoporus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3918.htm>



Pycnoporus cinnabarinus


Zinnoberrote Tramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae



Flammer, T©

514 28.09.2009



Flammer, T©

924 28.09.2009



Flammer, T©

9416 22.06.2019