



Rhodocollybia maculata

Gefleckter Rübbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Alb. & Schwein.) Singer 1939

Aktueller Name gem. MycoDB: Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer, Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 17: 71 (1939) [MB253156]

Basionym: Agaricus maculatus Alb. & Schwein., Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris: 186 (1805) [MB190275]

Obligates Synonym: Collybia maculata (Alb. & Schwein.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 117 (1871) [MB169412]

Die runden globosen, dextrinoiden Sporen helfen, diesen Pilz einzugrenzen.

makroskopisch

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Weiss, beige, hellbraun

Stielmerkmale

Am unteren Ende etwas bräunend, etwas wurzelnd, zugespitzt

Lamellenmerkmale

Deutlich gesägt

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Lamellen braun fleckend, Stielbasis rötlich-rötend

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Hyalin, crème - orange-crème

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Unbedeutend, nicht unangenehm (etwas erdartig)

Geschmack

Bitter

mikroskopisch

Sporenlänge

Relativ kleine Sporen 4,5 - 5.5 µm

Sporenform

Rund, rundlich, subglobos

Hutdeckschicht

Verwobene Hyphen

chemisch

Melzers-Reagenz

Dextrinoid

Gattung/en:

Rhodocollybia <https://www.mycopedia.ch/pilze/8184.htm>

Siehe auch

Rhodocollybia maculata <https://www.mycopedia.ch/pilze/10770.htm>

Tricholoma lascivum <https://www.mycopedia.ch/pilze/10221.htm>



Rhodocollybia maculata

Gefleckter Rubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

6204 21.08.2016




Flammer, T©

3917 15.09.2013



Flammer, T©

3918 15.09.2013



mit Wasser
Sporen

Flammer, T©

3942 30.07.2014



Rhodocollybia maculata

Gefleckter Rubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

