



## Russula alutacea

## Weinbrauner Ledertäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate

(Pers.) Fr. 1825

Aktueller Name gem. MycoDB: Russula alutacea (Pers.) Fr., Stirpes agri Femsionensis 5: 57 (1825) [MB163869]

Basionym: Russula esculenta var. alutacea Pers., Observationes mycologicae 1: 101 (1796) [MB494192]

Obligate Synonyme:

Agaricus alutaceus (Pers.) Pers., Synopsis methodica fungorum: 441 (1801) [MB308333]

Russula xerampelina var. alutacea (Pers.) Quéél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 341 (1888) [MB514325]

Taxonomische Synonyme: Russula alutacea f. rufoalba Singer, Beihefte zum Botanischen Centralblatt 49 (2): 254 (1932) [MB256554]

makroskopisch

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Gilbend

mikroskopisch

**Sporenlänge**

9-10 µm

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Stachelig-feinnetzig

**Gattung/en:**

Russula

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3941.htm>

Flammer, T©

14338 02.10.2022