



## Russula cyanoxantha

## Frauentäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate (Schaeff.) Fr. 1863

Aktueller Name gem. MycoDB: *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr., *Monographia Hymenomycetum Sueciae* 2: 194 (1863) [MB190250]  
 Basionym: *Agaricus cyanoxanthus* Schaeff., *Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones* 4: 40, t. 93:1-6 (1774) [MB201876]

Taxonomische Synonyme:

*Russula cutifracta* Cooke (1881) [MB190362]*Agaricus lividus* var. *angustatus* Pers., *Synopsis methodica fungorum*: 446 (1801) [MB493778]*Agaricus cynoxanthus* Pers., *Synopsis methodica fungorum*: 445 (1801) [MB494626]*Agaricus linnaei* var. *vagus* Fr., *Observationes mycologicae* 1: 69 (1815) [MB497913]*Russula cutifracta* Cooke, *Grevillea* 10 (54): 46 (1881) [MB326276]*Russula cyanoxantha* var. *cutifracta* (Cooke) Sarnari, *Bollettino dell Associazione Micologica ed Ecologica Romana* 27: 38 (1992) [MB359242]*Russula cyanoxantha* f. *cutifracta* (Cooke) Sarnari, *Bollettino dell Associazione Micologica ed Ecologica Romana* 28: 35 (1993) [MB360212]*Agaricus virescens* Krombh., *Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der Schwämme* 9: 15, t. 67:12-15 (1845) [MB513955]*Agaricus viridescens* Krombh., *Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der Schwämme* 9: Inhalt plates (1845) [MB514345]

## Atypische braune Form

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Sehr hart

**Hutmerkmale**

Huthaut 1/3 abziehbar, feucht etwas schmierig

**Lamellenfarbe**

Weiss

**Lamellenmerkmale**

Etwas fettig anzufühlen

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Sporenpulver weiss

olfaktorisch / organoleptisch

**Geschmack**

Mild

**Gattung/en:**

Russula

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3941.htm>



Russula cyanoxantha

Frauentäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae



Flammer, T©

12751 26.09.2021