



## Russula foetens

## Stinktäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate

Pers. 1796

Aktueller Name gem. MycoDB: Russula foetens Pers., Observationes mycologicae 1: 102 (1796) [MB187177]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus foetens (Pers.) Pers., Synopsis methodica fungorum: 443 (1801) [MB200730]

Agaricus incrassatus Sowerby, Coloured Figures of English Fungi 4: 197, t. 415 (1809) [MB200741]

Agaricus piperatus Bull., Herbar de la France 7 (73-84): Pl. 292 (1787) [MB144731]

Agaricus bulliardii Vahl, Flora Danica 6 (18): 7 (1792) [MB490119]

Agaricus bulliardii J.F. Gmel., Systema Naturae Ed. 13 2 (2): 1413 (1792) [MB490120]

Agaricus fastidiosus Pers., Annalen der Botanik (Usteri) 15: 9 (1795) [MB495357]

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Frisch etwas schmierig

**Stielmerkmale**

Hohl

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

An Druckstellen bräunend

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Stinkt, wie es der Name sagt: foetens

**Geschmack**

Scharf, "eckliger" Geschmack

**Gattung/en:**

Russula

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3941.htm>



Russula foetens

Stinktäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae



Flammer, T©

2700 16.09.2019



Flammer, T©

2699 21.07.2012



Flammer, T©

4762 26.09.2022



Flammer, T©

1849 06.08.2014



Russula foetens

Stinktäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

mit angewachsenem Hut



Flammer, T©

4809 06.08.2014