



## Russula olivacea

## Rotstieliger Ledertäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate

Pers. 1796

Aktueller Name gem. MycoDB: Russula olivacea Pers., Observationes mycologicae 1: 103 (1796) [MB497429]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus olivascens Pers., Synopsis methodica fungorum: 447 (1801) [MB192838]

Russula olivascens (Pers.) anon. (?) [MB476832]

Milder, harter und oft ziemlich grosser Pilz, oft mit rot überhauchten Stielen. Geruch am Stielende wird in der Literatur als fruchtig bezeichnet. Relativ grosse isoliertstachelige dunkel-ockere Sporen.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Sehr grosse und sehr harte Art

**Hutfarbe**

Polychrom: oliv, weinrot, violett, braun

Polychrom, ocker mit weinroten Farbtönen

**Stielfarbe / Rinde**

Rosa, weiss

**Lamellenfarbe**

Crèmefarbene Lamellen

**Lamellenmerkmale**

Relativ eng stehende Lamellen, spröd

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

IVd (Russula Farbtafel)

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Nichts besonderes, geruchlos

**Geschmack**

Mild

botanisch / ökologisch

**Standort**

Wächst gerne bei Trockenheit

**Vorkommen / Häufigkeit / Saison**

Häufige Art, oft in Gruppen mit zahlreichen Exemplaren

mikroskopisch

**Sporenlänge**

Meist über 10 µm

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Isoliertstachelig-isoliertwarzig, nicht vernetzt

**Primordialhyphen inkrustierte**

Keine inkrustierte Primordialhyphen im Gegensatz zu Russula integra

chemisch

**Phenolreaktion / C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH**

Sehr lebhaftige Reaktion mit 2% Phenol, Farbe nach zerquetschter Brombeere.

medizinisch

**Giftigkeit**

ROH GIFTIG !

**Russula olivacea****Rotstieliger Ledertäubling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Varia

**Wichtiger Hinweis**

Diese Art kann zu Völlegefühl, Bauchschmerzen, Brechreiz, Erbrechen oder Durchfällen führen, wobei Erbrechen nicht obligat ist. Dabei können verschiedene Ursachen eine Rolle spielen: individuelle Faktoren, ungenügende Zubereitung, konsumierte Menge, etc. Mindestens 20 Minuten kochen.

Das Farbspektrum dieser Art ist äusserst variabel.

**Dokumente**

Russula olivacea im Mischgericht - Periskop 019 - SZP 2008.06 [https://www.mycopedia.ch/literatur/szp/periskop\\_010.pdf](https://www.mycopedia.ch/literatur/szp/periskop_010.pdf)

**Gattung/en:**

Russula <https://www.mycopedia.ch/pilze/3941.htm>

**Siehe auch**

Russula integra <https://www.mycopedia.ch/pilze/4421.htm>



Russula olivacea

Rotstieliger Ledertäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae



Flammer, T©

12604 17.08.2022



Flammer, T©

12497 17.08.2022



Flammer, T©

12498 18.08.2022



Flammer, T©

2698 08.09.2022



Russula olivacea

Rotstieliger Ledertäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

