



Russula sanguinea

Blutroter Täubling, Bluttäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate

(Bull.) Fr. 1838

Aktueller Name gem. MycoDB: Russula sanguinea (Bull.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 351 (1838) [MB205048]

Basionym: Agaricus sanguineus Bull., Herbar de la France 1: t. 42 (1781) [MB534534]

Obligate Synonyme:

Agaricus sanguinolentus J.F. Gmel., Systema Naturae 2 (2): 1409 (1792) [MB494816]

Russula sanguinea Fr. (1838) [MB476730]

Taxonomische Synonyme:

Russula confusa Velen., Ceske Houby 1: 141 (1920) [MB261673]

Russula sanguinaria var. confusa (Velen.) Bon, Documents Mycologiques 23 (92): 48 (1994) [MB362023]

Russula sanguinea var. confusa (Velenovsky) Melzer & Zvara, Arch. pr. vyzk, Czech.: 95 (1927) [MB514210]

Russula acris Steinhaus, Hedwigia: 51 (1888) [MB169003]

Russula sulphurea Velen., Ceske Houby 1: 140 (1920) [MB279547]

Russula sanguinaria f. sulphurea (Velen.) Socha: 512 (2011) [MB586865]

Agaricus sanguinea Bull. (1781) [MB186499]

Russula sanguinea var. rosacea J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 5: 59, VIII (1940) [MB346401]

Russula sanguinea var. pseudorosacea Maire, Bulletin de la Société Mycologique de France 26: 69 (1910) [MB444279]

Russula sanguinaria var. pseudorosacea (Maire) Bon, Documents Mycologiques 23 (92): 48 (1994) [MB362022]

Agaricus integer Vahl, Fl. dan. 6: t. 1009: 1 (1790) [MB494695]

Agaricus sanguinarius Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 244 (1803) [MB480032]

Russula rosacea f. subcarnea Britzelm., Hymenomycten aus Südbayern 12 (Theil IX): Leucospori, Hyporhodie, Dermis, Melanospori, Cortinarius, Gomphidius, Hygrophorus, Lactarius, Russula, Marasmius, Lentinus, Trogia, Panus, Boletus, Polyporus, Thelephorei, Clavariet: 238, t. 505:75 (1893) [MB514209]

makroskopisch

Substrat

Pinus, seltener Picea

Hutfarbe

Lebhaft zinnoberrot, feucht etwas schmierig

Stielmerkmale

Weiss, rot überhaucht

Lamellenfarbe

Weiss-crème Lamellen

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Gelb

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Fruchtig

Geschmack

Scharf

mikroskopisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Isoliert grobwarzig

Primordialhyphen inkrustierte

Keine

chemisch

Phenolreaktion / C6H5OH

Positiv: braun im Stiel mit Phenol

Gattung/en:

Russula

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3941.htm>



Russula sanguinea

Blutroter Täubling, Bluttäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Siehe auch

Russula sanguinea

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10005.htm>



Russula sanguinea

Blutroter Täubling, Bluttäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae



Flammer, T©

5038 23.08.2014



Er scheint nährstoffreiche Böden zu mögen.

Flammer, T©

14580 17.10.2022

Göfis3_Alp_Almein


Sporenabwurf / Sporenfarbe

Sporen



Flammer, T©

5051 24.08.2014



Flammer, T©

5052 24.08.2014



Russula sanguinea

Blutroter Täubling, Bluttäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

