



Scutellinia scutellata complex

Orangeroter Schildborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyrenomataceae

Legitimate (L.) Lambotte 1887

Aktueller Name gem. MycoDB: *Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte, Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège, sér. 2 Ser. 2. 14 (7): 299 (1887) [MB119491]

Basionym: *Peziza scutellata* L., Species Plantarum 2: 1181 (1753) [MB158545]

Obligate Synonyme:

Patella scutellata (L.) Morgan, Journal of Mycology 8 (4): 187 (1902) [MB100201]

Peziza scutellata L. (?) [MB157961]

Lachnea scutellata (L.) Gillet, Champignons de France. Les Discomycètes 3: 75 (1880) [MB206869]

Ciliaria scutellata (L.) Boud., Bulletin de la Société Mycologique de France 3: 91 (1887) [MB433750]

Octospora scutellata (L.) Hedw., Florae Megapolitanae prodromus exhibens plantas ducatus Megapolitano-Suerinensis spontaneas: 261 (1788) [MB216351]

Humariella scutellata (L.) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3.2 (1): 37 (1893) [MB431727]

Humaria scutellata (L.) Fuckel, Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 321 (1870) [MB192322]

Peziza aurantiaca Bull., Herbier de la France 1 (1-12): t. 10 (1780) [MB497360]

Peziza aurantiaca Vent., Hist. champ. France: index, t. 10 (1812) [MB497361]

Scutellinia scutellata (L.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 869 (1891) [MB629594]

Taxonomische Synonyme:

Helvella ciliata Scop., Flora carniolica. Ed. 2 2: 481 (1772) [MB491635]

Peziza ciliata (Scop.) Hoffm., Vegetabilia Cryptogama 2: 25, t. 7:3 (1790) [MB161225]

Elvela ciliata Scop., Flora carniolica. Ed. 2 2: 481 (1772) [MB560515]

Peziza scutellata Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 432 (1803) [MB492726]

Ohne Färbung mit Baumwollblau ist die Ornamentierung schlecht zu erkennen. Es empfiehlt sich deshalb das Präparat mit Baumwollblau ein paar Std. einwirken zu lassen.

botanisch / ökologisch

Standort

Morschem nacktem Holz, vergrabendem Holz, lignicol

mikroskopisch

Sporenmasse

19.2 - 21.2 x 11.9 - 13.3 µm - Q: 1.50 - 1.76 (Ø LxB: 20.4 x 12.7 µm ØQ:1.6 AzM: 16)

Sporenform

Breitelliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Warzig

Paraphysen

Fädig-keulig, mit rotem Farbstoff

Haare

Gut sichtbare bis 900 µm lange braune zugespitzte, mehrfach septiert, an der Basis teilweise verzweigt wurzelnd

Gattung/en:

Scutellinia <https://www.mycopedia.ch/pilze/3964.htm>

Siehe auch

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10677.htm>



Scutellinia scutellata complex

Orangeroter Schildborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyrenomataceae



Flammer, T©

9350 10.07.2021



Flammer, T©

9349 12.06.2019



Flammer, T©

9351 12.06.2019



Flammer, T©

12440 08.07.2021



Scutellinia scutellata complex


Orangeroter Schildborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyrenomataceae



Flammer, T©

12438 08.07.2021



Flammer, T©

12439 08.07.2021



Flammer, T©

12446 10.07.2021