



Spathularia flavida

Dottergelber Spateling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Cudoniaceae

Legitimate

Pers. 1794

Aktueller Name gem. MycoDB: Spathularia flavida Pers., Neues Mag. Bot. 1: 116 (1794) [MB194814]

Taxonomische Synonyme:

Boletus elvela Batsch, Elenchus fungorum: 105 (1783) [MB468268]

Spathularia clavata (Schaeff.) Sacc., Syll. Fung. 8: 48 (1889) [MB194800]

Spathularia flava Pers., Commentatio de Fungis Clavaeformibus: 59 (1797) [MB194853]

Helvella clavata Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 100, t. 149 (1774) [MB222566]

Elvela clavata Schaeff. (1774) [MB560493]

Spathulea flavida (Pers.) Corda, Anleitung zum Studium der Mykologie: XCVII (1842) [MB847436]

Die Art ist nicht gerade häufig. Ich habe sie in meinem Gebiet bisher an 3 Standorten angetroffen, Mischwald bei Buchen.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Spatelartig, mit gelbem "Hut"

botanisch / ökologisch

Standort

Bei Fichte, Mischwald

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Sommer - Herbst

mikroskopisch

Sporenlänge

Bis 65 µm, sehr lang, spindelig

Gattung/en:Spathularia <https://www.mycopedia.ch/pilze/7150.htm>**Siehe auch**Spathularia <https://www.mycopedia.ch/pilze/7150.htm>



Spathularia flavida

Dottergelber Spateling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Cudoniaceae




Flammer, T©

765 28.09.2009



Flammer, T©

4991 17.08.2014



Flammer, T©

4990 17.08.2014



Flammer, T©




4992 17.08.2014



Spathularia flavida

Dottergelber Spateling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Cudoniaceae





Spathularia flavida

Dottergelber Spateling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Cudoniaceae

Sporen



Flammer, T©

6883 24.09.2017



Flammer, T©

6917 26.09.2017