



## Trichoderma viride

## Grüner Schimmelpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Hypocreaceae

Legitimate

Pers. 1794

Aktueller Name gem. MycoDB: *Trichoderma viride* Pers., Neues Mag. Bot. 1: 92 (1794) [MB181950]

Taxonomische Synonyme:

*Sphaeria rufa* Pers., Annalen der Botanik (Usteri) 15: 20 (1794) [MB184227]*Hypocrea rufa* (Pers.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 383 (1849) [MB162646]*Hypocrea rufa* subsp. *rufa* (Pers.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 383 (1849) [MB568626]*Trichoderma glaucum* E.V. Abbott, Iowa State College Journal of Science: 27 (1927) [MB252374]*Fusisporium arundinis* Corda, Icones fungorum hucusque cognitorum 1: 11, tab. 2, fig. 163 (1837) [MB208993]*Fusarium arundinis* (Corda) Sacc., Sylloge Fungorum 4: 724 (1886) [MB167361]*Pyrenium lignorum* Tode, Fungi Mecklenburgenses Selecti 1: 33, tab. 3, fig. 29 (1790) [MB355916]*Trichoderma lignorum* (Tode) Harz, Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 44: 116 (1871) [MB164673]*Trichoderma viride* Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 235 (1803) [MB496679]

mikroskopisch

**Sporenform**

Rundlich

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Fein punktiert

Varia

**Synonyme, Namen dt., Verweis***Trichoderma lignorum***Gattung/en:**

Trichoderma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8975.htm>Teleomorpe Form = Hauptfruchtform (*Hypocrea rufa*)

Flammer, T©

11985 15.01.2021

Anamorphe Form = Nebenfruchtform (*Trichoderma viride*)

Flammer, T©

11989 15.01.2021