



Tricholoma acerbum cf

Gerippter Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Bull.) Quél. 1872

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma acerbum (Bull.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 77 (1872) [MB193656]

Basionym: Agaricus acerbus Bull., Histoire des champignons de la France, 2 (2) pl. 541-676: 603, t. 571:2 (1812) [MB171337]

Obligates Synonym: Gyrophila acerba (Bull.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 11 (1886) [MB493835]

Strassenverkauf eines privaten Sammlers in Apulien. Auffällig sind die sehr kräftigen Fruchtkörper mit den fleckenden Lamellen, die gut zu Tricholoma acerbum passen.

Wird von Galli als "mediocre" beschrieben, der jedoch gerne mit Öl und Essig eingemacht wird.

makroskopisch

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Milchkaffeebraun

Hutmerkmale

Rand gerippt

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Lamellen flecken bräunlich

Varia


Bestimmt nach

I Tricholomi, Galli, R.

Gattung/en:

Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>



Flammer, T©

3311 27.10.2012

Verdorbene Hallimasch, Schirmlinge und Ritterlinge.



Flammer, T©

14080 15.09.2022