



## Tricholoma pardinum

## Tigerritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Pers.) Quél. 1873

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma pardinum (Pers.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard 5: 339 (1873) [MB356853]

Basionym: Agaricus myomyces var. pardinus Pers., Synopsis methodica fungorum: 346 (1801) [MB461533]

Taxonomische Synonyme: Tricholoma pardalotum Herink & Kotl., Česká Mykologie 21 (1): 5 (1967) [MB340332]

In der Schweiz gehört dieser Pilz in die Gruppe von verschiedenen Arten, welche 20 - 40 % aller Pilzvergiftungen ausmachen.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Grosser fleischiger Pilz bis 20 cm

**Hutmerkmale**

Grau-schwärzliche Schuppen

**Stielbasis / Basis**

Rötend

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Mehlig, nach Mehl

mikroskopisch

**Sporenmasse**

7 x 10 µm

chemisch

**Melzers-Reagenz**

Jod Sporen negativ (inamyloid)

medizinisch

**Giftigkeit**

GIFTIG !

Varia

**Synonyme, Namen dt., Verweis**

Tricholoma tigrinum, Tricholoma pardolatum

**Verursacht / verantwortlich für das folgende Syndrom:**

Gastrointestinales-Frühsyndrom <https://www.mycopedia.ch/pilze/3569.htm>

**Gattung/en:**

Tricholoma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>



Tricholoma pardinum

Tigerritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

1319 05.10.2009



Flammer, T©

10842 22.09.2020