



## Tricholoma psammopus

## Lärchenritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Kalchbr.) Quél. 1875

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard sér. 2, 5: 433 (1875) [MB355707]

Basionym: Agaricus psammopus Kalchbr., Icones selectae Hymenomycetum Hungariae per Stephanum Schulzer et Carolum Kalchbrenner observatorum. Magyarországi Hárta gombák válogatott képei 1: 12, t. 3:2 (1873) [MB461539]

Obligates Synonym: Gyrophila psammopus (Kalchbr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 12 (1886) [MB494219]

makroskopisch

**Stielbasis / Basis**

Dunkler, rötlich-braun

**Stielmerkmale**

Mit Flöckchen besetzt, hohl

**Lamellenfarbe**

Crème, gelblich

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Bei Berührung an der Basis rötend

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Nichts besonders

botanisch / ökologisch

**Standort**

Larix

mikroskopisch


**Sporenlänge**

6 µm - mit Öltropfen

**Gattung/en:**

Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>



Flammer, T©

11138 14.10.2020