



Tricholoma viridilutescens

Gesägtblättriger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate

M.M. Moser 1978

Aktueller Name gem. MycoDB: Tricholoma viridilutescens M.M. Moser, Fungorum rariorum Icones coloratae 7: 12-13 (1978) [MB324942]

Mit der Zeit blasst der Pilz aus und wird dann hellbraun-rehbraun-bräunlich. Diese Art weist eher dunklere / düstere Farben auf als die sehr ähnliche Tricholoma sejunctum und wächst vorwiegend bei Pinus.

makroskopisch

Hutmerkmale

Radialfaserig

Stielfarbe / Rinde

Gelblich

Lamellenfarbe

Gelblich, gelb

Lamellenmerkmale

Gesägt

botanisch / ökologisch

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Hauptsächlich Pinus, aber auch Picea und Abies

Gattung/en:

Tricholoma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1090.htm>**Siehe auch**

Tricholoma sejunctum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4362.htm>



Tricholoma viridilutescens

Gesägtblättriger Ritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

14275 28.09.2022



Flammer, T©

14276 28.09.2022



Flammer, T©

14277 28.09.2022